

ARS MEDICA Rep. ACCETTAZIONE 2	PREPARAZIONE TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA	MOD-ACC2-PTAC REV 7 – 30/06/17 PAG. 1 di 1
--	---	--

TC con M.D.C.	PREPARAZIONE
<input type="checkbox"/> ADDOMINALE <input type="checkbox"/> PELVICA <input type="checkbox"/> TOTAL BODY <input type="checkbox"/> ANGIOTC DISTRETTI CORPOREI <input type="checkbox"/> UROTC <input type="checkbox"/> BRONCOSCOPIA VIRTUALE <input type="checkbox"/> CRANIO-TORACE-COLONNA	Presentarsi a digiuno da 6 ore. Venire mezz'ora prima dell'appuntamento. PORTARE I SEGUENTI ESAMI (fino a due mesi): azotemia – Glicemia- Creatininemia- Protidogramma+EKG *

<input type="checkbox"/> CORONARIE	Presentarsi a digiuno da 6 ore. Venire mezz'ora prima dell'appuntamento. PORTARE I SEGUENTI ESAMI (fino a due mesi): Azotemia –Glicemia- Creatininemia- Protidogramma + E.C.G. Prima dell'appuntamento il paziente deve avere un approccio con il medico Radiologo poi parlare con il suo cardiologo perche' deve essere bradicardizzato (NON DEVE AVERE PIU' DI 65 BATTITI AL MINUTO) *
---	--

<input type="checkbox"/> ENDOSCOPIA VIRTUALE	<p><u>3 giorni prima dell'esame non mangiare:</u> legumi, verdure cotte e crude, latte, latticini, formaggi, frutta, pane e pasta. <u>Si può mangiare:</u> carne, pesce, uova e patate lesse.</p> <p><u>DUE GIORNI PRECEDENTI ALL'ESAME ASSUMERE:</u> LEVIANTIS BUSTINE 1 dose (2 bustine) sciolte in 200 cc di acqua mattina e sera. <u>IL GIORNO DELL'ESAME ASSUMERE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 dose (2 bustine) sciolte in 200 cc di acqua la mattina, e due ore prima dell'esame fare un clistere evacuativo Sorbicilis. • 5 ore prima della tac endoscopia virtuale assumere 70 ml di GASTROGRAFIN (che le consegneremo in segreteria) diluito in ½ litro di acqua e bere poi, dopo mezz'ora, mezzo litro di acqua naturale. osservare un digiuno fino all'orario della tac. <p>PORTARE I SEGUENTI ESAMI (fino a due mesi): Azotemia –Glicemia- creatininemia- Protidogramma.+ E.C.G. *</p>
---	--

<input type="checkbox"/> BIOPSIE TC GUIDATE	5) PORTARE I SEGUENTI ESAMI DEL SANGUE: EMOCROMO CON CONTA PIASTRINE-GRUPPO SANGUIGNO-GLICEMIA-AZOTEMIA-PT-PTT-FIBRINOGENO
--	--

TC senza Mezzo di Contrasto	PREPARAZIONE
<input type="checkbox"/> ADDOME E PELVICA-CRANIO-TORACE <input type="checkbox"/> TOTAL BODY <input type="checkbox"/> DENTASCAN <input type="checkbox"/> COLONNA (CERVICO-DORSO-LOMBARE) <input type="checkbox"/> SEGMENTI OSSEI	Nessuna preparazione

*I pazienti diabetici che assumono METFORMINA (es. METFORAL, GLUCOPHAGE, METFONORM ecc.) devono sospendere l'assunzione 48 ore prima dell'esame dopo aver consultato il medico curante che provvederà a sostituirlo con un altro prodotto antidiabetico. L'assunzione di Metformina potrà avvenire dopo almeno 48 ore dall'esame. Se il paziente non è affetto da insufficienza renale può assumere tutti gli altri farmaci come d'abitudine.

L'APPARECCHIATURA TC PERMETTE UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA DOSE DI RADIAZIONI IONIZZANTI (FINO AL 40%). SI RACCOMANDA DI PORTARE SEMPRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E TUTTI GLI ESAMI PRECEDENTI.

MODULO APPROVATO DAL MEDICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO RADIOLOGICO (PROF. GIUSEPPE NATALI)

FIRMA:

